

臺中市立太平幼兒園緊急傷病施救注意事項

中華民國 112 年 8 月 8 日訂定

一、依據：依幼兒園與其分班設立變更及管理辦法第 41 條。

二、目的：迅速提供發生事故傷害病之幼生及教職員工緊急救護與疾病照護措施，以確保其安全，降低風險危害程度，期使傷害減至最低。


三、緊急救護支援單位：

單位名稱	電話	地址
市府消防局救災救護指揮中心	119	
臺中市政府消防局第三救災救護大隊車籠埔分隊	04-22792947	台中市太平區光興路 1463 巷 33 弄 67 號

四、鄰近醫院

醫院名稱	電話	地址
臺中國軍總醫院太平院區	04-23934191	臺中市太平區中山路二段 348 號
長安醫院	04-36113611	臺中市太平區永平路一段 9 號

五、緊急傷病處理流程：



(一)傷患處置：

幼生及教職員工發生事故傷害或突發疾病時，在場人員應立即將傷患送至健康中心，如傷患不宜移動者，迅速報知健康中心或行政人員到現場急救，如有心跳呼吸停止，在場人員應立即呼叫拿取 AED 並施行 CPR 等待救援，其餘急症、事故傷害依緊急傷病處理方法(附件二)處理。事故現場如有繼續性之危險時，應兼顧救助者自身安全下，助患者離開現場或等待救援。

(二)通報：

1. 立即通報教保員、護理師等相關人員。
2. 需緊急醫療救護者同時通報 119，報知災害發生地址、種類、範圍及傷病患情況。
3. 教保員或行政人員於瞭解情況後，應立即於傷患家屬取得連繫告知情況。
4. 於期限內上網進行「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」。

(三)傷患護送就醫：

如輕症、無生命危險者，則通知家屬接回就醫，如有立即生命危險者，則由護理師、班級教保員護送就醫。

(四)其他事務：

1. 護送人員得予公假，園方負責調派臨時代理人。
2. 必要時班級教保員、護理師等協助進行創傷身心輔導事項。

六、救護設備：

本園應備以下救護設備並保持立即可用狀態，教保員、護理師等應熟悉急救設備操作方法，以因應突發傷病事件救護之需。

(一)一般急救箱(二)攜帶式人工甦醒器(三)骨折固定器材。

七、建立緊急聯絡：

(一)各班教保員應建立幼生緊急聯絡電話，每學年開學後二週內完成緊急聯絡電話之更新與確認，緊急聯絡電話除父母親或監護人外，應至少另列其他緊急聯絡人一人，各班聯絡電話複本一份留辦公室備用。


(二)每學年開學後一個月內普查學生特殊疾病現況資料，幼生有特殊疾病史應了解其緊急處置配合事項，以救護車護送至最近的醫療診救治。

(三)建立教職員工意外事故緊急連絡人、電話。

八、於事件發生一星期內應將緊急傷病處理情形（包含傷病種類、發生時間、地點、緊急救護處理過程等）提出書面報告，並建檔、定期統計分析管理，作為安全教育宣導及改善環境設施參考。

九、本計畫經由園長核可後實施，修正時亦同。

臺中市立太平幼兒園緊急傷病施救處理紀錄表 (附件一) 注意：應保存7年

事故日期：__年__月__日__時__分；類別： <input type="checkbox"/> 創傷 <input type="checkbox"/> 非創傷；地點： <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 其他_____			
基本資料	姓名：_____性別： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 班級：_____ 過去病史： <input type="checkbox"/> 心臟病 <input type="checkbox"/> 氣喘 <input type="checkbox"/> 糖尿病 <input type="checkbox"/> 癲癇 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 無		
	家屬姓名：_____電話：_____通知家屬人員：_____通知時間：__時__分		
健康中心	接獲通知時間：__時__分 到達現場時間：__時__分 送至健康中心： <input type="checkbox"/> 是，時間：__時__分，護送人員： <input type="checkbox"/> 老師 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 其他_____ 護送方式： <input type="checkbox"/> 攙扶 <input type="checkbox"/> 抱 <input type="checkbox"/> 揹 <input type="checkbox"/> 自行 <input type="checkbox"/> 其他_____		
生命徵象及身體評估	第一次評估時間：__時__分		第二次評估時間：__時__分
	意識： <input type="checkbox"/> 清楚 <input type="checkbox"/> 對聲音有反應 <input type="checkbox"/> 對疼痛有反應 <input type="checkbox"/> 無反應 瞳孔： <input type="checkbox"/> 等大 <input type="checkbox"/> 不等大 <input type="checkbox"/> 反應(+) <input type="checkbox"/> 無(-) 體溫： <input type="checkbox"/> _____°C 呼吸： <input type="checkbox"/> _____次/分 <input type="checkbox"/> 無 脈搏： <input type="checkbox"/> _____次/分 <input type="checkbox"/> 無 血壓： <input type="checkbox"/> _____mm Hg <input type="checkbox"/> 無 皮膚： <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 潮紅 <input type="checkbox"/> 蒼白 <input type="checkbox"/> 發紺 <input type="checkbox"/> 濕冷 <input type="checkbox"/> 濕熱		意識： <input type="checkbox"/> 清楚 <input type="checkbox"/> 對聲音有反應 <input type="checkbox"/> 對疼痛有反應 <input type="checkbox"/> 無反應 瞳孔： <input type="checkbox"/> 等大 <input type="checkbox"/> 不等大 <input type="checkbox"/> 反應(+) <input type="checkbox"/> 無(-) 體溫： <input type="checkbox"/> _____°C 呼吸： <input type="checkbox"/> _____次/分 <input type="checkbox"/> 無 脈搏： <input type="checkbox"/> _____次/分 <input type="checkbox"/> 無 血壓： <input type="checkbox"/> _____mm Hg <input type="checkbox"/> 無 皮膚： <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 潮紅 <input type="checkbox"/> 蒼白 <input type="checkbox"/> 發紺 <input type="checkbox"/> 濕冷 <input type="checkbox"/> 濕熱
	受傷部位		主訴/代訴
			急救處理
	+ 疼痛位置 /// 擦傷- 撕裂傷		<input type="checkbox"/> 意識改變、昏迷 <input type="checkbox"/> 暈厥、頭暈、頭痛 <input type="checkbox"/> 胸痛, 胸悶 <input type="checkbox"/> 呼吸困難 <input type="checkbox"/> 吐血 <input type="checkbox"/> 噁心、嘔吐、腹痛 <input type="checkbox"/> 抽搐 <input type="checkbox"/> 肢體無力疼痛 <input type="checkbox"/> 背痛 <input type="checkbox"/> 發燒 <input type="checkbox"/> 其他_____
送醫	送醫地點：_____ 護送人員：_____ 送醫方式： <input type="checkbox"/> 救護車，通知時間：__時__分；到達時間：__時__分 <input type="checkbox"/> 計程車 <input type="checkbox"/> 自行開車 <input type="checkbox"/> 家長送醫 <input type="checkbox"/> 其他_____ 離開現場時間：__時__分；到達醫院時間：__時__分		
後續追蹤			
護理師：_____ 教保員：_____ 教保組長：_____ 園長：_____			

臺中市立太平幼兒園緊急傷病處理方法

(附件二)

一、常見急症處理原則：

類別	處理方法
發燒	多喝水、休息、溫水擦拭、冰枕使用，通知家長送醫就診。
腹痛	胃痛—休息，如未改善通知家長送醫就診。 脹氣—腹部塗抹含薄荷油類藥品，順時針方向輕輕按摩，助排氣。 外力引起—密切觀察有無內出血徵象(臉色蒼白、血尿、頭暈或噁心、倦怠)， 懷疑有內出血情況立刻送醫就診。 不明原因—通知家長送醫就診
嘔吐	了解嘔吐的原因及性質，暫時休息不要進食，通知家長送醫就診。
暈眩	1. 將患者移至陰涼處。 2. 評估可能造成原因，如：心臟病、甲狀腺疾病、糖尿病、貧血、中暑、情緒引起、脫水、熱病、體質較弱、低血糖、驚嚇 3. 維持呼吸道通暢、鬆開衣服，平躺並抬高下肢 20~30 公分。 4. 保暖：四肢冰冷者，覆蓋棉被或毛毯。 5. 意識清醒者，可以適度補充溫水，非清醒者不可給任何飲料。 6. 若患者清醒，因血糖過低（如未吃早餐），可給予糖水。 7. 有嘔吐情況且意識不清者改採復甦姿勢 8. 送醫就診。 如嚴重休克，無呼吸心跳者立刻施行心肺復甦術，並迅速送醫急救。
異物哽塞	1. 輕度哽塞（咳嗽、呼吸困難）： 2. 鼓勵患者用力咳嗽將異物咳出，不要拍其背或加以干擾，直到異物咳出。 3. 嚴重哽塞（手抓住自己的喉嚨，無法咳嗽、說話、呼吸、臉色發紫、甚至意識消失、昏迷）立即實施哈姆立克法，如因異物哽塞而失去意識，立即以 CPR 步驟施救。
呼吸心跳停止	立即實行心肺復甦術（CPR）及使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）。 同時呼叫撥打 119，請求救護支援。
癲癇發作	1. 移開患者周圍尖銳或危險物品。 2. 將衣領放鬆，頭轉側一邊，防止嘔吐物堵住氣道，維持呼吸道通暢。 3. 勿強行壓制、約束患者肢體的抽搐。 4. 陪伴患者直到發作結束，記錄發作時間。 5. 立刻通知家長並送醫治療。

二、常見事故傷害處理原則：

類別	處理方法
創傷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢視傷口。 2. 止血後，予清潔、消毒傷口並包紮。 3. 傷口深或面積大者應送醫處理。
頭部外傷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 局部瘀腫：冰敷。 2. 挫裂傷：加壓止血、清潔消毒傷口，以紗布敷蓋加繃帶或三角巾固定，如傷口較大、較深需送醫請醫師評估是否需縫合。 3. 如有頭痛、暈等情形，通知家屬帶回家休息，並留意 72 小時內是否有劇烈頭痛、暈眩、連續嘔吐、噁心。 4. 懷疑頸椎有受傷者勿任意移動患者
流鼻血	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保持坐立而頭部稍向前傾的姿勢。 2. 用拇指或食指由出血側鼻翼（鼻下端較軟處，非上端硬的鼻骨），由外向內壓迫鼻中膈前端，直接壓迫約 5~10 分鐘。 3. 冰敷鼻樑。 4. 如果壓迫 10 分鐘以上仍未止血，需送醫處理。
燙傷	<p>以沖、脫、泡、蓋、送五大原則處理。</p> <p>沖：流動的冷水沖洗傷口 15 至 30 分鐘。</p> <p>脫：於水中小心除去衣服。</p> <p>泡：在冷水中持續浸泡 15 至 30 分鐘。</p> <p>蓋：覆蓋乾淨的布巾，勿塗抹任何東西。</p> <p>送：送醫治療。</p>
扭傷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 休息（Rest）：患部勿再活動或施力，勿推拿或用力按摩。 2. 冰敷（Icing）：冰敷時間為 15~20 分鐘，休息 10~20 分鐘，扭傷 48 小時後方可熱敷或按摩。 3. 壓迫（Compression）：以彈性繃帶壓迫患處，避免繼續腫脹，留意繃帶勿過度緊繃以免造成血液循環不良。 4. 抬高患部（Elevation）：以利消腫。 5. 若有嚴重之創傷，可能是脫臼或骨折，應送醫院作進一步處理。
骨折	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查傷肢有無畸型、腫脹、碎裂聲、疼痛、是否能活動，如有臉色蒼白、冒冷汗、表情痛苦，須考慮有骨折的可能。 2. 懷疑骨折時： <ol style="list-style-type: none"> a. 勿試圖移動、拉直患肢。 b. 有傷口、出血者，先止血、清消傷口。 c. 以固定板固定，由遠端向近端包紮，勿太鬆或太緊。 d. 儘速送醫。

眼睛傷害	<p>1. 異物入眼時：</p> <p>(1) 閉眼休息使大量淚水分泌以排出異物，勿揉眼睛以免造成結膜發炎、角膜損傷</p> <p>(2) 可用煮過冷開水或生理食鹽水沖洗眼睛。</p> <p>2. 化學物質入眼（如漂白水、清潔劑等化學物質）：</p> <p>以大量生理食鹽水或清水沖洗，並立即送醫。</p>
蜂螫	<p>1. 用消毒的鑷子或小刀挑出螫刺。</p> <p>2. 用清水沖洗被螫傷皮膚，並冰敷。</p> <p>3. 留意有無毒性反應(水腫、倦怠感、嘔吐、腹瀉、頭痛、低血壓、抽筋、意識不清等)或過敏反應(蕁麻疹、氣喘、低血壓、休克等)，如有上述兩種反應需立即送醫治療。</p>
耳、鼻孔異物進入	勿任意嘗試取出，應送耳鼻喉科處理。
牙齒撞掉	<p>1. 將掉牙保存在鮮乳、自己的口水、生理食鹽水或清水中，並在黃金一小時內儘速就醫。</p> <p>2. 如果掉牙太髒，只可用生理食鹽水稍做沖洗後立即以上述方法保存，勿以刷子或手刷、搓洗，以免造成牙周細胞組織的壞死。</p>
蛇咬	<p>1. 觀察並記錄蛇的種類。</p> <p>2. 患者應減少活動，除去傷肢之束縛物（如手環或戒指等）。</p> <p>3. 傷肢低於心臟，使用彈性繃帶包紮患部，鬆緊度以能夠插入一根手指頭為原則，以減少毒液經由淋巴回流，並避免產生患肢缺血症狀。</p> <p>4. 勿冰敷、切開傷口、用嘴巴吸出毒液</p> <p>5. 儘速送醫。</p>
高處墜落	<p>1. 切記勿隨便移動傷者。</p> <p>2. 立刻通知 119 送醫。</p> <p>3. 有傷口或懷疑骨折時，先止血、清消、包紮、固定骨折部位。</p>